

PROGRAMA



FERNANDO FÚSTER

Jefe de Área de Vigilancia de Riesgos Ambientales en Salud. SG de Seguridad Alimentaria y Sanidad Ambiental. DG de Salud Pública. Consejería de Sanidad. Comunidad de Madrid



JAVIER LUCIENTES CURDI

Catedrático de Sanidad Animal. Área de Parasitología. Departamento de Patología Animal. Profesor de la Facultad de Veterinaria. Universidad de Zaragoza.



OSCAR SORIANO

Científico Titular. Departamento de Biodiversidad y Biología Evolutiva. Museo Nacional de Ciencias Naturales – CSIC



DAVID BRAVO

Director Técnico de CTL Sanidad Ambiental.




PATRICIA VALLE

Jefe de grandes cuentas y licitaciones, Sur de Europa. Kenogard



sanidad ambiental

JORNADA GESTIÓN MOSCA NEGRA



915.745.390



info@ctl-plagas.com



Calle Laguna de Marquesado
38J. 28021 Madrid



Ayuntamiento de Valdemoro



KENOGARD
CULTIVAMOS LA INVESTIGACIÓN



Comunidad de Madrid
CONSEJERÍA DE SANIDAD



sanidad ambiental

JORNADA GESTIÓN MOSCA NEGRA



www.ctl-plagas.com



Los simúlidos, también conocidos como "mosqueta negra o randella", son insectos cuyas picaduras pueden ser dolorosas e incluso peligrosas para el hombre y el ganado.

Se distribuyen por todo el mundo en zonas cálidas o templadas y existen alrededor de 1300 especies conocidas. Son diurnos y se alimentan de jugos vegetales, aunque las hembras necesitan tomar sangre para madurar los huevos.

Sus larvas se fijan mediante una ventosa terminal y viven en grandes sociedades compactas. La pupa se desarrolla dentro de un capullo sedoso fijado al sustrato, y el período larvario dura de 3 a 5 semanas.

Los adultos tienen un radio de vuelo de hasta 16 km y viven de tres a cuatro semanas. Las picaduras son más intensas al amanecer y al anochecer, y pueden producir edemas que se infectan y tardan en curarse.

ctl. sanidad ambiental

PROGRAMA

- **9:30-10h.** Recogida credenciales
- **10-10:30h.** Inaguración por la Concejal
- **10:30-11h.** Javier Lucientes: Los simúlidos y su problemática respecto a la salud pública
- **11-12h.** Pausa café
- **12-12:20h.** Fernando Fúster. Plan de gestión vectorial-simúlidos en CM
- **12:20-12:40h.** Óscar Soriano. Seguimiento de poblaciones de mosca negra en CM
- **12:40-13h.** David Bravo. Tratamiento de simúlidos
- **13-13:20h.** Patricia Valle. Larvicidas biológicos
- **13:30-14:15h.** Preguntas y Debate

Presentamos una estrategia y métodos de control integrado de plagas, enfocándose en el control preventivo antes que en el control intensivo, para respetar el medio ambiente. Se emplean medidas físicas, mecánicas y químicas, como la aplicación de biocidas específicos y respetuosos con el ambiente.

Se destacan las técnicas de aplicación de larvicidas y adulticidas desde medios terrestres. El control de los simúlidos se centra en el control de los focos de cría (larvas) para evitar la aparición de adultos, realizando actuaciones adulticidas solo en caso de vuelo incontrolado de adultos.

El producto larvicida se aplica solo cuando se detectan poblaciones inmaduras de simúlidos. Se establece un seguimiento continuo de la evolución poblacional con una periodicidad quincenal y el momento de la aplicación se determina según el primer estado larvario o la homogenización de las generaciones.

El insecticida se aplica por pulverización directa en el área lótica del curso de agua, es decir, en las zonas de corriente, y se emplea un pulverizador portátil a presión para cubrir áreas de cría inaccesibles con otros equipos.